

COLLECTIONS RECUEILLIES PAR M. M. DE ROTHSCHILD
DANS L'AFRIQUE ORIENTALE.
DESCRIPTION D'UN COLÉOPTÈRE LATHRIDIEU NOUVEAU,
PAR M. PIC.

Melanophthalma Rothschildi nov. sp.

Satis latus, nitidus, luteo-pubescens, rufescens, oculis, antennis articulis tribus ultimis exceptis nigris, pedibusque pallidis. *M. proxima* Pic vicinus. — Africa orientalis.

Assez large, brillant, orné d'une pubescence flave en partie soulevée, roussâtre avec les antennes, moins leur massue qui est noire, et les pattes d'un testacé pâle. Tête relativement petite, longue, à ponctuation forte, pas très rapprochée, à tempes grandes, saillantes et bien marquées; yeux noirs, assez saillants; antennes grêles, d'un testacé pâle, à massue foncée, celle-ci tri-articulée, 1^{er} article très épais, 2^e peu épaissi et plus long que large, les suivants plus ou moins allongés et grêles; prothorax peu plus large que long, à ponctuation forte pas très rapprochée, très rétréci en avant et modérément en arrière, un peu dilaté vers le milieu, marqué en dessus et près de la base d'une dépression transversale; élytres larges, sub-ovales, courtement atténués au sommet, à épaulures marquées mais arrondies, faiblement striés mais fortement ponctués en rangées, la ponctuation moins forte vers l'extrémité de ces organes; dessous du corps de la coloration du dessus; pattes d'un testacé pâle. Long., 2 millim. environ.

Afrique orientale : Makanissa, avril 1905 (M. de Rothschild in Muséum de Paris).

Très voisin de *M. proxima* Pic. de l'Amérique méridionale, mais ayant les tempes encore plus marquées et les élytres de forme plus trapue.

Cette espèce s'ajoutera à une série d'autres antérieurement décrites. Je suis heureux de donner encore le nom de *Rothschildi* à une des nombreuses formes nouvelles rapportées par ce zélé et heureux explorateur.

COLLECTIONS RECUEILLIES PAR M. LE BARON MAURICE DE ROTHSCHILD
DANS L'AFRIQUE ORIENTALE,

Insectes hyménoptères : Sphérides et Évaniides.

PAR M. LE D^r P. MAGRETTI.

Parmi les Hyménoptères récoltés par M. le Baron M. de Rothschild pendant son voyage en Abyssinie et dans l'Afrique orientale anglaise, il se trouve 29 espèces appartenant aux familles des Pompilides, Spérides,

Crabronides et Évaniides. Ils sont répartis dans 14 genres et 6 sous-genres. Trois espèces sont nouvelles ainsi que deux variétés très distinctes; en voici les diagnoses préliminaires :

1. *PHILANTUS TRIANGULUM* Fabr. var. *limaculatum*, *mili*.

♂. *Segmento primo abdominali nigro, maculis duabus flavis utrinque ocellaribus ornato, segmentis sequentibus tote flavis; interdum III^o-V^o basi nigromaculatis vel fasciatis.*

Localité. — Nairobi et Lumbwa (août, sept. 1906).

2. *Ph. ugandicus* nov. sp.

♀ *Capite nigro, opaco, dense crebreque punctato; mandibularum dimidiè basali rufo-ferrugineo, apice nigro; clypeo, genis, macula frontali biloba inter antennas et maculis linearibus retro-orbitalibus eburneo-flavescentibus. Antennis nigris basi et apice rufo-ferrugineis, flagelli articulo primo, secundo tertioque simul sumptis valde breviorè. Thorace nigro longe flavo-piloso, pronoti margine, scutello et postscutelli linea angusta transversa, flavo-eburneis. Mesonoto et pleuris dense crebreque punctatis, scutello et postscutello laevibus, sparse punctatis, metanoti area semilunari basali dorsali laevi, subopaca, medio forca ocali impressa; metanoto apice dense punctulato. Alis hyalinis, tegulis, nervis tote flavo-aurantiacis, posticarum venula anali cum vena transversa interstitiali. Abdomine nigro, laevi, nitido, elongato, maculis duabus subtriangularibus utrinque in segmenti primi dorso, fasciis lata in segmento secundo, fasciis angustis in segmentorum IIIⁱ-Vⁱ marginibus, ita ut maculis linearibus parvis in dorso tertii segmentoque anali (basi nigra excepta) fasciisque in ventre aequè ac in dorso dispositis, lacte rufo-ferrugineo pictis. Pedibus nigris, femorum apicibus, tibiis tarsisque totis ut abdominis fasciis, rufo-ferrugineis. Metatarsis anticis et mediis ita ut tibiis et metatarsis posticis spinulis longis concoloribus armatis.*

Corp. long., 1/4 millim.

Localité. — Naivasha (sept. 1906).

3. *Oxybelus Neuvillei* nov. sp.

♂. *Niger, albo et flavo pictus; mandibulis (apice extremo excepto), antennarum scapo et flagelli articulo primo (sequentibus testaceis), pronoto margine elevato, late cum callis humeralibus, alarum tegulis, maculis magnis rotundis utrinque in scutelli dorso, postscutelli mucrone fere toto (basi nigra excepta) fasciis interruptis in sequentibus I-IV abdominis dorso, Vⁱ fascia integra, sexto et anali totis, pedibus (corvis, trochanteribus et femorum dimidio basali exceptis) eburneo-flavo pictis (propter actionem acidi in rufo-ferrugineo mutato). Capite crebre minuteque punctato (in occipite postico parumper striolato), ocellis magnis in triangulo obtuso sut lato dispositis; fronte, in regione*

ocellari, lata, infra usque ad antennarum basin, angustiore. Clypei margine distincte tridentato.

Pronoto (margine lineari depresso laeci excepto), mesonoto, mesopleuris et scutello minus crebre at crassius punctatis; metapleuris longitudinaliter strigoso-plicatis nitentibus; scutello, in medio dorsi, carinula lamelliformi longitudinali-elevata praedito; postscutelli margine lineari, utrinque lamellis rostriformibus pellucidis instructo, mucrone mediano canaliculiforme, apice profunde exciso, bifido, ramulis valde divergentibus; metanoto carinulis lateralibus circumscripto, areis utrinque punctulatis, area mediana cordiformi, fovea crassa sub mucrone impressa, nitida. Abdomine crebre et crasse punctato; segmentorum II-VI angulis apicalibus externis utrinque spinula subrostriformi instructis. Area pygidiali rectangulari, rugosa.

Alis hyalinis, nervulis flavo-testaceis. Metatarsis anticis basi interna obtuse crebris, spinulis pectinalibus tenuibus, longis sex, tibiarum intermediarum et posticarum marginibus superis spinulis brevioribus crassioribusque instructis. Corp. long., 6 millim.

Localité. — Sud du lac Rodolphe (sept. 1905).

4. *Palarus Rothschildi* nov. sp.

♂. Niger, eburneo flavoque pictus; clypeo, fronte usque ad ocellum magnum, mandibularum basi, maculis linearibus postocularibus, pronoti margine angulisque latioribus, callis humeralibus, alarum tegulis, maculis triangularibus in mesonoti angulis anticis et in propleuris, scutelli margine postico ita ut postscutello cum lineis lateralibus, metanoti mucronibus mediis marginalibus, maculis utrinque in segmentorum abdominalium I-VI lateribus eburneis. Antennarum flagello supra, pedibus, alarum nervulis, squamula centrali segmenti secundi et valcula anali, flavo-rufescentibus. Alis hyalinis.

Clypeo margine apicali truncato, una cum fronte et genibus, laevibus subnitidis. Antennarum dimidio apicali quam basali leviter crassiore, flagelli articulo secundo tertio vix longiore, sequentibus inter se longitudine aequalibus. Oculis ad verticem valde convergentibus, summo apice articulorum flagelli latitudine inter se distantibus. Mandibulis basi lata, subquadrata, angulo infero leviter producto, margine deinde inciso, parte media dilatata, apice angustato, obtuso. Fronte supra antennis leviter gibbosa, supra ocellum magnum unicum triangulariter producta. Pronoto laeci, parce elevato, mesonoti valde inferiore. Mesonoto, propleuris scutelloque nitidis, sparse sed crasse profundeque punctatis; postscutello angusto lineari, laeci, nitido; mesopleuris angustis, subnitidis, partim transverse striatis; metanoto in dorso crasse oblique plicato-rugoso, fovea mediana lata subcirculari transverse rugosa, postice et in metapleuris laevi nitido-splendente. Abdomine subtriangulariter elongato, nitido, sparse minute punctulato; segmento primo lato, antice incurvato, lateribus valde prominulis, facie interna nitida-splendente, sequentibus segmentis invicem angustio-

ribus. Segmenti analis valvula pygidiali elongata ovali, apice profunde arcuatim incisa, supra plana, nitida, lateribus parce elevata; ventre valde incrassato, subcurvato, basi spinula parva dentiformi utrinque instructo. Segmento ventrali secundo lumina magna semi-circulari elevata una cum anteriori minore praedito.

Femoribus inermibus, tibiis modice setuloso-spinosis, tarsis longe setoso-pectinatis, articulo ultimo majore elongato, pulvillo nigro, magno.

Corp. long., 10 millim.

Localité. — Endessa (haut Aouache, sept. 1905).

5. BRACHYGASTER MINUTUS Oliv. var. *aethiopicus*, mihi.

♂. A typo specifico differt: dentibus duobus distinctis in unguis focoolae aetonioli sub abdominis petioli insertione; metamoto postice pubescentia dense griseo-sericea tecto, ejusdem sculptura mediana fere obsoleta. Sulcis frontibus carentibus ab arcis obsoletis semi-circularibus punctulatis substitutis; crista in oculorum marginibus distincta intus elatiore; ocellis posticis inter se plus quam tribus eorum diametris distantibus, eorum distantia ab oculis vix uno diametro aequante; tibiarum posticarum calcaribus inter se longitudine aequalibus, metatarsi tertia parte longitudine aequalibus.

Localité. — Harrar (mars 1905).

HÉMIPTÈRES D'AFRIQUE (TOGO ET ABYSSINIE).

PAR M. RENÉ COURTEAUX.

Elasmopoda ampliata nov. sp.

♂. Corps étroit, d'un brun marron, couvert en dessus d'une pubescence dorée, plus dense sur la partie antérieure du pronotum. Tête quadrangulaire. d'un brun marron plus pâle; yeux très saillants; ocelles très petits, éloignés entre eux du double de la distance qui les sépare des yeux. Antennes d'un brun ferrugineux; premier article plus long que le quatrième; deuxième article légèrement caréné en dessus et en dessous, de longueur égale aux deux tiers du premier; troisième article plus largement caréné, un peu dilaté au delà du milieu, plus court que le précédent; quatrième article un peu plus long que le deuxième, entièrement flave testacé ainsi que la base et le sommet des deuxième et troisième articles. Rostre ferrugineux, atteignant les hanches intermédiaires; premier article plus foncé, subégal au second; le troisième plus court.

Pronotum rugueux; le disque antérieur, vu de côté, incliné environ à 45 degrés sur la ligne ventrale du corps; côtés antérieurs munis de trois